



Focus sur un essai d'immunothérapie accessible aux PVVIH en première ligne métastatique du cancer du canal anal


[Lien NCT](#)

NEWSLETTER RÉSEAU CANCERVIH

août 2022

Réseau Expert National pour les patients infectés par le VIH et atteints de cancer

www.cancervih.org



Le cancer du canal anal est un des cancers non-classant-SIDA les plus fréquents chez les PVVIH, son risque relatif est estimé à environ 47¹. Très peu de traitements standards existent au-delà de la première ligne pour cette pathologie et la chirurgie, parfois très délabrante, peut véritablement sabrer la qualité de vie des patients.

L'essai de phase 2 « PODIUM-202 » d'Incyte a testé un anti-PD1 (le Retifanlimab) en seconde ligne dans le cancer du canal anal. Les PVVIH étaient inclutables si elles étaient sous traitement antirétroviral et avaient au minimum 300 CD4/ μ L et une charge virale indétectable. La France a été le premier pays recruteur mondial, tous patients confondus et en nombre de PVVIH incluses. Au niveau mondial, 94 patients ont été inclus dont 9 PVVIH. 13 patients avaient répondu et 33 patients ont stabilisé leur cancer. La tolérance était similaire à celle des anti-PD1 et aucun effet délétère des paramètres immuno-virologiques liés au VIH n'a été noté². Cet essai a ouvert la voie de l'immunothérapie dans ce cancer.

L'essai de phase 3 « PODIUM-303 » d'Incyte teste le Retifanlimab en première ligne métastatique du cancer du canal anal en association avec une chimiothérapie standard (Carboplatine Paclitaxel) versus un bras contrôle de chimiothérapie seule. Il est accessible aux PVVIH si elles sont sous traitement antirétroviral depuis au moins 4 semaines et si elles ont au minimum 200 CD4/ μ L et une charge virale indétectable³.

Cet essai est ouvert aux inclusions et peut être une véritable opportunité pour vos patients infectés par le VIH et atteints de cancer du canal anal.

Pour tout renseignement, n'hésitez-pas à contacter marianne.veyri@aphp.fr

¹Shiels MS, Cole SR, Kirk GD, Poole C. A meta-analysis of the incidence of non-AIDS cancers in HIV-infected individuals. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2009;52(5):611-22

² Rao S, Capdevila J, Gilbert D, Kim S, Dahan L, Kayyal T, Fakih M, Demols A, Jensen LH, Spindler KG, Arnold D, Tamperi S, Guren MG, Cornfeld M, Jones M, Tian C, Catlett M, Spano JP. PODIUM-202: Phase II study of retifanlimab in patients (pts) with squamous carcinoma of the anal canal (SCAC) who progressed following platinum-based chemotherapy. Abstract LBA42 ESMO 2020

³ Rao S, Jones M, Bowman J, Tian C, Spano JP. PODIUM-303/InterAACT 2: A Phase III, Global, Randomized, Double-Blind Study of Retifanlimab or Placebo Plus Carboplatin-Paclitaxel in Patients With Locally Advanced or Metastatic Squamous Cell Anal Carcinoma. *Front. Oncol.* 2022, accepted

D.U. Cancer de l'immunodéprimé

Optimiser la prise en charge des patients immunodéprimés atteints de cancers (personnes vivant avec le VIH ou transplantées)

2022 →
2023

Le Réseau
CANCERVIH à
l'honneur dans ce
Special Issue de
Cancers !

Lien [ici](#)

Nouveau format
hybride pour notre
D.U. Cancer de
l'immunodéprimé
2022 - 2023 : à la fois
en présentiel et en
visioconférence

Programme &
inscriptions :
www.cancervih.org

Journée nationale du Réseau CANCERVIH

vendredi
16 déc.
2022

4ème édition

INSCRIPTIONS : cancervih.org

Special Issue de Cancers  cancers
« Perspectives on Kaposi's sarcoma »

Coordonné par le Réseau CANCERVIH
Guest Editor : Pr Jean-Philippe Spano
Associate Editor : Dr Romain Palich
Coordination : Marianne Veyri

Optimiser la prise en
charge des personnes
vivant avec le VIH
atteintes de cancer